

## Перевод животных из секции позднего сухостоя в родильное отделение

### I. Коровы

- а. Ежедневно проверять каждое животное на наличие двух ушных бирок (заменить при необходимости).
- б. При необходимости проводить медицинский осмотр неотелившихся в срок животных.

### II. В Секциях для перегона (1-4,) необходимо:

- а. Вычищать стойла как минимум дважды в день.
- б. Ежедневно посыпать лежки известкой, чтобы поддерживать зону «вымени» в чистоте и сухости.

## Процесс отела

### I. Отел

- а. Совершать обход секции 17-18 каждый час круглосуточно
- б. Переместить коров и телок в отдельные боксы (денник) во время начала отела.

### в. Обращать внимание на наличие:

1. Кровянистых или чистых, но обильных выделений
2. Плаценту или “околоплодную сумку”
3. Конечностей и нос теленка
4. Обильное выделение молока
5. Слабых или частых потуг
6. Поднятого вверх хвоста

- г. Если требуется помощь при выгоне животных на отел, сообщите заведующему новотельной секции. Ночью или в случае отсутствия заведующего, сообщите зоотехнику смены.

### II. Отдельные боксы для отела (денник)

1. При смене отела меняйте бокс для того, чтобы предыдущий бокс смог просохнуть после его использования.
2. Разбросайте свежую солому в боксе **прежде**, чем поместить туда корову.
3. Обмакните все соски чашкой с раствором йода сразу после перемещения коровы в бокс (включая телок)
4. Накормите всех животных, находящихся в деннике свежим смешанным кормом и напоите их водой.
5. Запишите в карточку всю необходимую информацию, т.е., почему корову поместили сюда, время перегона, все клинические признаки
6. *Коровы не должны находиться в боксах родильного отделения дольше, чем необходимо*

## Отел

### I. Сразу же после отела:

- а. При необходимости проверьте на наличие двойни. Проверьте только в том случае, если у коровы не прекращаются схватки и есть явные признаки наличия второго теленка. **Не забывайте, что каждый раз, при проникновении внутрь коровы рукой, мы значительно увеличиваем риск возникновения послеродовой инфекции.** До и после проверки на наличие двойни продезинфицируйте область вокруг половых органов.
- б. Незамедлительно заставьте корову подняться и простоять по меньшей мере 1 час (обеспечьте свежей водой и кормом).
- г. Используйте путы для фиксации ног для коров, у которых могут возникнуть трудности с передвижением по бетону.
- е. Запишите всю необходимую информацию в карточке коровы ,т.е. номер теленка, степень тяжести родов, любое оказанное лечение, или другую особую информацию.

- II. Первый час после отела:
- а. Сообщите зоотехнику о необходимости подоить коров и сохранить молозиво.
  - б. Если дойка закончена, переведите коров в новотельную секцию. Оставьте любое «качающееся» животное в боксе и посоветуйтесь с заведующим новотельной секции прежде, чем перегонять корову в новотельную секцию (ночью сообщите зоотехнику смены).
  - в. Запишите информацию о перегоне коровы в карточке отела.

III. Инструменты для оказания помощи при отеле

- а. **Все оборудование должно быть тщательно вымыто после каждого использования (включая родовспомогательный аппарат).**
- б. После использования все оборудование должно быть убрано на место.

б. Необходимое оборудование:

1. Специальные цепи или ремни
2. Ручки для цепей
3. Родовспомогательный аппарат в хорошем рабочем состоянии
4. 2 ведра
5. Веревки для помощи при отеле
6. Веревка для фиксации морды животного
7. Гигиеническая смазка
8. 5% раствор йода для обработки пуповины
9. 0.5% раствор йода (из доильного зала) для обработки сосков и добавления в воду для приготовления дезинфицирующего раствора
10. Чашка для нанесения йода на соски
11. Резиновые перчатки и нарукавники
12. Бумажные полотенца

**работа с новорожденным:**

- I. Сразу же после рождения:
- а. Обработать пуповину йодом. Убедиться, что вся область тщательно обработана.
  - б. Сделать укол Е-селена + инъекция сыворотки
  - в. Повесить бирку на ухо
  - г. Обтереть теленка чистой соломой, вместе с телятницей отвезти теленка на площадку.